

Datos de este titular del «pasaporte»

Nombre: _____

Tenga en cuenta los problemas relacionados con el párkinson que pueden afectar mi viaje:

Marque las casillas correspondientes:

- Mi habla y capacidad para comunicarme**
- Mi coordinación**
- Mi movilidad**
- Tengo una estimulación cerebral profunda (ECP) Implante** que me obliga a mantenerme alejado de dispositivos electromagnéticos. Este dispositivo se coloca en el pecho o el abdomen, con cables que suben por el cuello hasta el cuero cabelludo.
- Tengo una bomba de infusión para la administración de medicamentos y llevaré los dispositivos necesarios.** Normalmente, la bomba se lleva en una bolsa específica o se sujeta a la cintura. Se puede usar con seguridad durante el vuelo y no interfiere con los sistemas del avión, ni siquiera durante el despegue o el aterrizaje.

PÁRKINSON PASAPORTE

INFORMACIÓN MÉDICA ESENCIAL



parkinson's
europe

Evitar dispositivos de seguridad y de control/escaneo en aeropuertos y otros lugares

El implante de estimulación cerebral profunda puede verse afectado por dispositivos eléctricos o magnéticos (ver lista a continuación). Por lo tanto, debo evitar la interacción con sistemas electromagnéticos que puedan causarme molestias y afectar el funcionamiento del implante, e incluso apagarlo accidentalmente.

- Si es necesario realizar un registro corporal, éste debe realizarse manualmente y por parte de agentes de seguridad.
- Se puede utilizar un detector de seguridad manual, pero NO debe colocarse sobre el implante, que está colocado en mi pecho o abdomen.

Los sistemas que afectan al implante son:

- Escáneres corporales en aeropuertos.
- Dispositivos como detectores de robo (es decir, los que se utilizan en las entradas y salidas de tiendas).
- Equipos eléctricos como máquinas de soldar.
- Transmisores de microondas.
- Amplificadores de potencia.
- Electrodomésticos que contienen imanes, como refrigeradores, altavoces estéreo y herramientas eléctricas.

Artículos que podríamos necesitar llevar

- Medicamentos necesarios durante el vuelo o viaje (pastillas, comprimidos o parches).
- Dispositivos médicamente necesarios, como bombas de infusión y plumas inyectables.
- Jeringas o ampollas precargadas.
- Cánulas (tubos cortos y delgados) que se insertan en el cuerpo.

- Podríamos necesitar más tiempo del habitual en el check-in o la recepción. Por favor, concédanos tiempo adicional.
- Tenga paciencia cuando caminamos, hablamos o comemos: realizar varias tareas a la vez puede resultar difícil.
- Recoger cosas del suelo o de lugares bajos puede ser complicado.
- Tenga en cuenta que el párkinson afecta a los músculos faciales; sonreír o expresar emociones puede ser difícil. Es posible que no siempre podamos responderle como deseamos.
- Si tiene dificultades para movernos, no nos empuje ni tire de nosotros.
- Cuando nos ofrecen bebida, es más fácil si estamos sentados.
- Si ve que alguno de nosotros está pasando por dificultades, no se aleje: pregunte si necesitamos ayuda.

Accesibilidad y soporte

Contactos de emergencia

1. Nombre: _____

Relación conmigo: _____

Teléfono (incluido el código del país): _____

2. Nombre: _____

Relación conmigo: _____

Teléfono (incluido el código del país): _____

Médico/a: _____

Dirección del centro médico : _____

Teléfono (incluido el código del país): _____

Firma o sello del médico/a:



Fecha: / /

Mi medicación

Es muy importante que reciba la dosis correcta de mis medicamentos en el momento oportuno. La siguiente tabla se encuentran más detalles:

Nombre del medicamento: _____

Dosificación: _____

Momento: _____

Nombre del medicamento: _____

Dosificación: _____

Momento: _____

Nombre del medicamento: _____

Dosificación: _____

Momento: _____

En caso de emergencia médica

NO administre los siguientes medicamentos a personas con párkinson.

- **Medicamentos contra las náuseas**, como metoclopramida, ciclizina y proclorperazina. Si se requiere un antiemético, se recomienda la domperidona.
- **Antipsicóticos**: no se debe usar haloperidol. La quetiapina es el fármaco de elección. Se pueden considerar otros antipsicóticos atípicos (p. ej., risperidona, olanzapina) si no se tolera la quetiapina.
- **Analgésicos**: evitar petidina y otros opioides en combinación con selegilina y rasagilina.

Durante la cirugía

- Si se requiere anestesia local, la adrenalina debe administrarse con precaución.
- **El tratamiento con bomba de infusión Duodopa** puede mantenerse siempre que permita la administración oral de líquidos y medicamentos. Puede desconectarse durante la cirugía si es necesario.
- **El tratamiento con bomba de infusión de apomorfina** puede continuar antes, durante y después de la cirugía.

Tratamiento y cirugía (cont.)

- Si tengo un implante de estimulación cerebral profunda, este puede desactivarse durante la cirugía. En caso de requerirse, solo debe utilizarse el tratamiento de diatermia bipolar.

No debo realizarme los siguientes tratamientos o terapias:

- Imágenes por resonancia magnética (IRM) a menos que el proveedor del sistema las apruebe específicamente
- Cualquier terapia dirigida al sitio de mi implantación, incluyendo ultrasonido, electrólisis, radioterapia, electrocirugía y electromagnetización.
- Radiografía que comprima el área(s) de implantación (se permiten otras radiografías)
- Ultrasonido para limpieza dental
- Desfibrilación cardíaca
- Cualquier tratamiento médico que implique que una corriente eléctrica pase a través del cuerpo desde una fuente externa debe utilizarse con precaución.