

Dit paspoort is eigendom van:

Naam: _____

Onderstaande symptomen, gerelateerd aan de ziekte van Parkinson, kunnen zich voordoen gedurende mijn reis:

De symptomen waar ik last van heb, heb ik hieronder aangekruist.

- Verminderde spraak- en communicatievaardigheden
- Verminderd coördinatievermogen
- Beperkingen in mobiliteit
- Ik draag een implantaat voor diepe hersenstimulatie (DBS), waarvoor het noodzakelijk is om afstand te bewaren van elektromagnetische apparaten. Dit implantaat is geplaatst in mijn borst- of buikregio, met kabels die via mijn hals naar de hoofdhuid lopen.
- Ik gebruik een infuuspomp voor de toediening van medicatie en draag de bijbehorende hulpmiddelen bij me. De infuuspomp draag ik doorgaans in een speciale draagtas bevestigd aan mijn middel. Het apparaat is veilig te gebruiken aan boord van vliegtuigen en zal geen belemmering vormen voor de vliegtuig-instrumenten, ook niet tijdens het opstijgen en landen.

PARKINSON PASPOORT

BELANGRIJKE MEDISCHE INFORMATIE



parkinson's
europe 

- Bodyscanners op luchthavens.
- Apparaten zoals diefstal detectors (die bijvoorbeeld gebruikt worden bij de in- en uitgangen van winkels)
- Elektrisch apparaat, zoals lasapparaat.
- Microgolftzenders.
- Eindhoveners.
- Huishoudelijke apparaten die magneten bevatten,

Implantaat:

Systemen die storingen kunnen veroorzaken op het

- Indien een foullering noodzakelijk is, dient deze handmatig te worden uitgevoerd door bevestigingspersoneel.
 - Het gebruik van een handheld beveiligingsscanneer is toegestaan, mits deze **NIE**T rechtstreeks over de neurostimulator wordt gehouden, die zich in de borst of buik bevindt.
- Om die reden dergelijke apparaten vermijden of zoveel mogelijk afstand van houden.

Het vermijden van beveiligings en screening / scanapparatuur op luchthavens en andere locaties

Op de Deep Brain Stimulation (DBS)-implantaat kunnen electrisch of magnetisch apparaat (zie onderstaande lijst) ongemak veroorzaken, de werking verstoren of het zelfs per ongeluk uitschakelen.

- ### Fysieke toegankelijkheid en ondersteuning
- Bij het inchecken aan de balie of de receptie kan het zijn dat er iets meer tijd nodig is dan gebruikelijk. Graag uw begrip hiervoor.
 - Multitasken, zoals lopen, spreken en eten tegelijk, kan problemen opleveren.
 - Het oppakken van spullen kan soms lastig zijn.
 - Parkinson kan effect hebben op onze gezichtsspijeren, waardoor lachen en gezichtsuitdrukkingen minder duidelijk te zien zijn. Onze reacties kunnen daardoor anders overkomen dan verwacht.
 - Gelieve niet te duwen of te trekken bij moeite met bewegen.
 - Even gaan zitten en wat drinken kan helpen.
 - Indien er parkinson-gerelateerde problemen opgemerkt worden, blijft dan even in de buurt en vraag gerust of hulp nodig is.
- ### Medische benodigheden die we mogelijk bij ons dragen
- Medicatie die tijdens de reis of vlucht nodig is (bijvoorbeeld pillen, tabletten of pleisters).
 - Medische hulpmiddelen die noodzakelijk zijn, zoals infuuspompen en injectiepenen.
 - Voorgevulde spuiten of ampullen.
 - Canules (korte, dunne buisjes) die in het lichaam worden ingebracht.

Bij noodgevallen contactpersonen

1. Naam: _____

Relatie: _____

Tel.nr. (incl. landcode): _____

2. Naam: _____

Relatie: _____

Tel.nr. (incl. landcode): _____

Huisarts: _____

Adres van de praktijk: _____

Tel.nr. (incl. landcode): _____

Handtekening of stempel
van de huisarts:

Datum: / /

Hulp kan nodig zijn bij het innemen van medicatie

Het is van groot belang om de juiste dosering op de juiste tijdstippen in te nemen. Zie hieronder de gegevens:

Naam van het medicijn: _____

Dosering: _____

Tijdstip: _____

Naam van het medicijn: _____

Dosering: _____

Tijdstip: _____

Naam van het medicijn: _____

Dosering: _____

Tijdstip: _____

Belangrijke medische info bij noodgevallen

Deze medicijnen NIET toedienen aan mensen met de ziekte van Parkinson.

- **Medicijnen tegen misselijkheid** - zoals metoclopramide, cyclizine en prochlorperazine mogen niet worden toegediend. Indien een anti-emeticum nodig is, dient domperidon te worden gebruikt.
- **Antipsychotica** - haloperidol mag niet worden toegediend. Quetiapine is het middel van eerste keus. Andere atypische antipsychotica, zoals risperidon en olanzapine, kunnen worden overwogen als quetiapine niet wordt verdragen.
- **Pijnstillers:** Pethidine en andere opioïden mogen niet gelijktijdig met selegiline of rasagiline worden gebruikt.

Tijdens de operatie

- Als plaatselijke verdoving noodzakelijk is, dient adrenaline met voorzichtigheid te worden toegediend.
- **De Duodopa-pompinfusiebehandeling** kan worden voortgezet zolang orale inname van vocht en medicatie mogelijk is, maar kan tijdens de operatie tijdelijk worden stopgezet.
- **De apomorfine-pompinfusie** mag vóór, tijdens en na de operatie continu worden voortgezet.

Vervolg - belangrijke medische info

- Indien ik een Deep Brain Stimulation (DBS)-implantaat draag, kan mijn DBS tijdens de operatie worden uitgeschakeld en mag uitsluitend bipolaire diathermie worden toegepast.

De volgende behandelingen en therapieën mag ik niet ondergaan:

- Magnetic Resonance Imaging (MRI), tenzij specifiek goedgekeurd door mijn systeemleverancier
- Behandelingen gericht op het implantatiegebied: zoals echografie, elektrolyse, radiotherapie, elektrochirurgie en elektromagnetisatie
- Radiografie waarbij druk wordt uitgeoefend op het implantatiegebied; andere vormen van radiografie zijn wel toegestaan
- Echografie voor gebitsreiniging
- Hartdefibrillatie
- Medische behandelingen waarbij elektrische stroom van buitenaf door het lichaam wordt geleid, dienen met grote voorzichtigheid te worden uitgevoerd.